




راهنمای گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ (کرونا ویروس) – بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا



معاونت بهداشت

۱۳۹۹ فروردین

نسخه دوم

مقدمه:

بیماری ناشی از کروناویروس COVID_۱۹ (۲۰۱۹) عفونت سیستم تنفسی است که توسط دسته ای از کروناویروس ها SARS-COV-۲ ایجاد می شود و تظاهرات کلینیکی آن از علائم شبیه سرماخوردگی خفیف تا پنومونی ویرال شدید همراه با دیسترس تنفسی حاد، متفاوت است.

با توجه به شیوع بیماری کووید-۱۹ در کشور، احتمال ابتلای شاغلینی که در محیط های کاری متفاوت ارائه خدمت می نمایند نیز به این بیماری وجود دارد. نظر به میزان بالای سرایت بیماری و وجود عالیم غیراختصاصی در اکثر مبتلایان، رویکرد دوری از محیط کار حتی با وجود عالیم غیراختصاصی سرماخوردگی، مورد توجه بوده است و تعداد افرادی که با احتمال ابتلا در دوران اپیدمی بیماری، در استعلامی به سر می برند، قابل توجه است. از آنجا که از یک سو، این بیماری می تواند عوارض جدی و مخل عملکرد ایجاد کند و از سوی دیگر، برای همه این افراد امکان انجام تست های تشخیصی قطعی وجود ندارد، شرایط بازگشت به کار آنها، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. لذا افرادی که با احتمال ابتلا، از محیط کار دور بوده اند، پس از سپری شدن دوره بیماری در صورت نیاز، جهت بازگشت به کار مورد ارزیابی تخصصی قرار می گیرند. این ارزیابی می باشد هم جنبه اطمینان از پایان سرایت پذیری بیماری به سایر شاغلین و مراجعین وی را شامل شود و هم بررسی عوارض بیماری (که عملکرد شاغل را تحت تاثیر قرار می دهد و یا شاغل را نسبت به مواجهات محیط کار آسیب پذیرتر می نماید).

با وجود اطلاعات اندکی که تاکنون در زمینه بیماری کووید-۱۹ منتشر گردیده است، این راهنمای اساس شواهد فعلی از رفتار ویروس و سیر بیماری، جهت یکسان سازی روند بازگشت به کار تدوین گردیده تا علاوه بر کمک به مراقبت از سلامت شاغلین، در کنترل این عفونت در محیط کار و در نهایت جامعه به وظیفه خود عمل نماییم.

دامنه کاربرد

این راهنمای مشمول کلیه شاغلین با احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ می باشد که از محیط کار دور بوده اند و پس از گذراندن دوره درمان و نقاوت، جهت بازگشت به کار، نیازمند بررسی شرایط سلامتی و ارزیابی های تخصصی می باشند.

تعاریف

مورد مشکوک:

- فرد با شرح حال سرفه خشک یا لرز یا گلودرد همراه با تنگی نفس با یا بدون تب که با عامل اتیولوژیک دیگری قابل توجیه نباشد
- بیمار دارای تب و یا علائم تنفسی (با هر شدتی) که :
- سابقه تماس نزدیک^۱ با مورد محتمل/قطعی بیماری COVID-۱۹ در عرض ۱۴ روز قبل از شروع

علائم بیماری را داشته باشد

• کارکنان بهداشتی - درمانی

موارد محتمل:

مورد مشکوکی است که:

- با تظاهرات رادیولوژیک که از نظر رادیولوژیست به شدت مطرح کننده بیماری کووید-۱۹ می باشد نظیر انفیلتراسیون مولتی لوبلر یک یا دو طرفه خصوصاً انفیلتراسیون نواحی پربرفال در CT scan ریه یا رادیوگرافی قفسه صدری و glass ground (Clinically confirmed) scan CT در ریه.
- فرد مبتلا به پنومونی که علیرغم درمان های مناسب، پاسخ بالینی نامناسب داشته و به شکل غیر معمول و سرعت غیرقابل انتظاری وضعیت بالینی بیمار حادتر و وخیم تر شده است (Clinically confirmed).
- نتیجه آزمایش PCR فرد معلوم نیست به عنوان مثبت یا منفی قطعی گزارش نشده result Inconclusive است.

مورد قطعی:

- فرد با تایید آزمایشگاهی ویروس ناشی از عفونت کووید-۱۹ صرف نظر از وجود علائم و نشانه های بالینی و ارتباط نزدیک

تماس نزدیک چنین تعریف می شود :

- تماس بیمارستانی (شامل ارائه مستقیم خدمت بالینی کادر بیمارستانی به بیمار محتمل/قطعی کووید-۱۹)
 - تماس با عضو دیگری از تیم درمانی که خود مبتلا به کووید-۱۹ شده باشد
 - مراقبت مستقیم فردی از افراد خانواده از بیمار مشکوک/محتمل/قطعی کووید-۱۹ نموده است
 - هر تماس شغلی (شامل همکار بودن یا همکلاس بودن) با فرد مبتلا به کووید-۱۹ در فضای بسته‌ی مشترک (تماس بیش از ۱۵ دقیقه در فاصله کمتر از ۲ متر)
 - همسفر بودن با فرد مبتلا به کووید-۱۹ در یک وسیله نقلیه مشترک
- تبصره: موارد مشکوک، محتمل، قطعی و تماس نزدیک براساس فلو چارت تشخیص و درمان بیماری کووید-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری (نسخه پنجم، ششم فرودین ماه ۱۴۰۰) تعریف شده و در صورت ابلاغ نسخه جدید و تغییر تعاریف شامل این راهنمای نیز می شود.

افراد مجاز به بررسی بازگشت به کار شاغلین

با توجه به گستردگی بیماری کووید-۱۹ در کشور و ماهیت بیماری، افراد زیر مجاز به بررسی شاغل با احتمال ابتلا به کووید-۱۹ از نظر بازگشت به کار می‌باشند:

- متخصص طب کار
- متخصص عفونی
- متخصص داخلی
- فوق تخصص ریه
- پزشک عمومی دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی بر اساس دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی
- پزشکان عمومی مراکز خدمات جامع سلامت منتخب (۱۶ یا ۲۴ ساعته)

تبصره ۱: کلیه پزشکان مجاز ذکر شده، فعال در بخش خصوصی نیز در صورت تمایل میتوانند در زمینه بازگشت به کار شاغلین از نظر سرایت پذیری کووید-۱۹ اظهارنظر کنند.

تبصره ۲: در صورتی که پزشک معاینه کننده متخصص طب کار نمی‌باشد و آسیب به ارگانهای هدف در بیمار وجود دارد، لازم است مشاوره با متخصص طب کار جهت تعیین تناسب شغلی و ارزیابی تاثیر مواجهات محیط کار بر شاغل، انجام گردد. در صورتی که متخصص طب کار در دسترس نباشد پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی می‌توانند ارزیابی این افراد را انجام دهند. لیست متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز از سایت معاونت های بهداشت دانشگاه مربوطه در دسترس می‌باشد.

تبصره ۳: در بررسی افراد مورد اشاره در تبصره ۲، ارزیابی مواجهات محیط کار و نظریه کارشناس بهداشت حرفه‌ای در خصوص نوع و میزان مواجهات مورد توجه قرار گیرد.

تبصره ۴: در مشاغلی که مواجهات شیمیایی وجود ندارد مانند کارکنان اداری، دفتری و نظایر آن، گواهی کلیه پزشکان مجاز فوق الذکر، جهت بازگشت به کار (بدون نیاز به تناسب شغلی و ارزیابی مواجهات محیط کار)، قابل قبول است.

روش کار:

۱- ارزیابی مواجهات محیط کار:

پزشک می‌بایست ضمن آگاهی از روند فعالیت شغلی فرد و آشنایی و شناخت مواجهات وی در محیط کار، اقدام به بررسی وضعیت بازگشت به کار فرد نماید. در همین راستا کسب اطلاع کامل از شرح وظایف شاغل، شرایط ویژه محیط کار و مواجهات شغلی با استفاده از گزارش اندازه گیری مواجهات محیط کار و شنا سنامه شغل یا استعلام از کارشناس بهداشت حرفه‌ای مربوطه و یا بازدید مستقیم از واحد کاری، ضروری است.

با توجه به ارگان‌های هدف در بیماری کووید-۱۹، ارزیابی مواجهات تنفسی، حالله، هپاتوتوكسیک‌ها و نفروتوكسیک‌ها و کاردیوتوكسیک‌ها، در اولویت بررسی مواجهات شغلی قرار دارند.

۲- ارزیابی وضعیت ابتلای فرد به کووید-۱۹:

به منظور تعیین وضعیت بازگشت به کار بیمار، می باشد سیر بالینی فرد در بیماری کووید-۱۹ مشخص شده و موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

- درمان بیمار به صورت سرپایی صورت گرفته است یا به صورت بستری؟

- در موارد بستری : مدت زمان بستری،تاریخ بستری مشخص گردد. آسیب سایر ارگان ها و وضعیت PCR قبل از تشخیص چگونه بوده است؟

- در موارد سرپایی: زمان شروع و بهبود علائم را مشخص گردد. سیر علائم چگونه بوده است؟ بیماری چند روز طول کشیده است؟ تنگی نفس جزء علائم وی بوده یا خیر؟ PCR برای تشخیص انجام شده است؟ در پایان درمان PCR منفی دارد یا خیر؟

۳- ارزیابی وضعیت سلامت جسمی فرد:

شرح حال و معاینه فیزیکی کامل فرد، در ارزیابی علائم و نشانه های بیماری کووید-۱۹ و وضعیت فعلی شاغل دارای اهمیت ویژه می باشد. با توجه به امکان درگیری ارگان هایی از قبیل سیستم تنفسی، قلبی-عروقی، کلیوی و یا کبدی در این بیماری، ارزیابی جامع این ارگان ها، در صورت صلاححید پزشک، لازم می باشد.

- ارزیابی سیستم تنفسی:

علاوه بر بررسی وجود علائم تنفسی و ارزیابی وضعیت ریه در معاینه فیزیکی، در صورت نیاز و با صلاححید پزشک باید ارزیابی های پاراکلینیک مرتبط هم صورت پذیرد.

- پالس اکسیمتری:

در صد اشباع اکسیژن خون (O₂sat) یکی از معیار های آسیب ریوی در بیماری کووید-۱۹ می باشد. این مقدار اگر بالای ۹۳٪ باشد نرمال و کمتر از آن، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

-**Six-minute walk test (6MWT)**

جهت ارزیابی افت درصد اشباع اکسیژن حین فعالیت استفاده می شود. روش انجام آن بر اساس معیار های ATS (American Thoracic society) می باشد.

- ارزیابی قلبی عروقی:

شرح حال و معاینه فیزیکی کامل سیستم قلبی عروقی فرد در تعیین و ضعیت بازگشت به کار وی اهمیت زیادی دارد به ویژه در افرادی که ماهیت کاری آنها به نحوی است که فعالیت فیزیکی متوسط به بالا نیاز است. ارزیابی های پاراکلینیک بر حسب مورد و در صورت نیاز به اطلاع از عملکرد قلبی عروقی شامل موارد زیر می شود:

سطح خونی تریپونین، نوار قلب (EKG)، اکوکاردیوگرافی و تست ورزش

- ارزیابی کلیوی:

یکی از ارگان های هدف بیماری کووید-۱۹، کلیه ها می باشد و در صورت تشخیص پزشک و یا وجود مواجهات نفروتوکسیک در محیط کار لازم است فعالیت کلیوی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

- ارزیابی عملکرد کبدی:

در صورت آسیب کبدی در زمان بیماری و یا وجود مواجهات هپاتوتوكسیک در محیط کار با تشخیص پزشک انجام می گردد.

تطابق با الگوریتم بازگشت به کار:

پس از ارزیابی کامل بیمار با شرح حال، معاینه فیزیکی و در صورت لزوم پاراکلینیک، لازم است بازگشت به کار فرد براساس الگوریتم ذیل مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه در فرم مربوطه (فرم بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به COVID۱۹) ثبت و به کارفرما بازخورد گردد. علاوه براین لازم است فرم خوداظهاری علائم نیز توسط شاغل تکمیل و امضای گردد.

تبصره-دوره های قرنطینه بیماران بستری و سرپایی ذکر شده در الگوریتم، بر اساس آخرین نسخه "فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری (ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید، نسخه پنجم، ششم فرودین ماه ۱۴۰۰)" می باشد. بدیهی است در صورت تغییر پروتکل کشوری، این الگوریتم نیز به روز رسانی و اطلاع رسانی می گردد.

تعیین بازگشت به کار:

بر اساس نتایج بررسی های انجام شده، چنانچه مشخص شود بیمار در حال حاضر به علت احتمال سرایت پذیری امکان بازگشت به کار را ندارد، پزشک می بایست زمان ارزیابی مجدد وی را تعیین نماید.

فرم بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به COVID-۱۹

نام و نام خانوادگی:	سن:	کد ملی:
نام کارخانه/کارگاه/سازمان:	عنوان شغلی:	شرح حال و معاینه فیزیکی:
پاراکلینیک:		
نظریه پزشک:		
<input type="checkbox"/> ز نظر سریت پذیری بیماری کووید-۱۹ منع حضور در محل کار ندرد.		
<input type="checkbox"/> عدم مکان حضور در محل کار و بررسی مجدد روز بعد		
<input type="checkbox"/> رجاع به متخصص طب کار / پزشک عمومی دری مجوز (در صورت عدم دسترسی به متخصص طب کار) به علت درگیری رگان های هدف (تنفسی، کلیه، قلب، کبد) جهت رزیابی تناسب شغلی		
مهر و مضای پزشک		
تاریخ		
نظریه تناسب شغلی متخصص طب کار/پزشک عمومی دری مجوز در صورت وجود آسیب رگان هدف:		
<input type="checkbox"/> بلامانع		
<input type="checkbox"/> مشروط به :		
<input type="checkbox"/> عدم صلاحیت		
مهر و مضای پزشک متخصص طب کار /پزشک دری مجوز معاینات سلامت شغلی		
تاریخ		

فرم خوداظهاری یازگشت به کار شاغلین با سایقه ابتلا به COVID19

نام و نام خانوادگی:	کد ملی:	سن:												
نام کارخانه/کارگاه/سازمان:	عنوان شغلی:													
لطفا به پرسش‌های زیر با نهایت دقیق پاسخ دهید:														
<p>(۱) روند درمان به چه صورت بوده است؟</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">تاریخ ترخیص:</td> <td style="width: 30%;">تاریخ بستری:</td> <td style="width: 40%;"><input type="checkbox"/> بستری</td> </tr> <tr> <td>()</td> <td>()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>چند روز پس از شروع علائم، حساس بهبودی داشته بود؟</td> <td>(تاریخ شروع علائم):</td> <td><input type="checkbox"/> سرپایی</td> </tr> </table>			تاریخ ترخیص:	تاریخ بستری:	<input type="checkbox"/> بستری	()	()		چند روز پس از شروع علائم، حساس بهبودی داشته بود؟	(تاریخ شروع علائم):	<input type="checkbox"/> سرپایی			
تاریخ ترخیص:	تاریخ بستری:	<input type="checkbox"/> بستری												
()	()													
چند روز پس از شروع علائم، حساس بهبودی داشته بود؟	(تاریخ شروع علائم):	<input type="checkbox"/> سرپایی												
<p>(۲) در سه روز خیر کدام علامت زیر را همچنان در خود حساس کرده بود؟</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/> تب</td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/> لرز</td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/> سرفه</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> تنگی نفس</td> <td><input type="checkbox"/> گلودرد</td> <td><input type="checkbox"/> بدن درد</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> حساس خستگی و ضعف</td> <td><input type="checkbox"/> درد یا حساس سنگینی</td> <td><input type="checkbox"/> قفسه سینه <input type="checkbox"/> هیچکدام</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> تب	<input type="checkbox"/> لرز	<input type="checkbox"/> سرفه	<input type="checkbox"/> تنگی نفس	<input type="checkbox"/> گلودرد	<input type="checkbox"/> بدن درد	<input type="checkbox"/> حساس خستگی و ضعف	<input type="checkbox"/> درد یا حساس سنگینی	<input type="checkbox"/> قفسه سینه <input type="checkbox"/> هیچکدام			
<input type="checkbox"/> تب	<input type="checkbox"/> لرز	<input type="checkbox"/> سرفه												
<input type="checkbox"/> تنگی نفس	<input type="checkbox"/> گلودرد	<input type="checkbox"/> بدن درد												
<input type="checkbox"/> حساس خستگی و ضعف	<input type="checkbox"/> درد یا حساس سنگینی	<input type="checkbox"/> قفسه سینه <input type="checkbox"/> هیچکدام												
<p>(۳) آخرین روزی که مصرف ستامینوفن یا ناپروکسن داشته بود را ذکر کنید.</p>														
<p>(۴) سابقه کدام یک از بیماریهای زیر را دارد؟ علامت بزنید</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/> بدخیمی (نوع سرطان)</td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/> پیوند عضاء</td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/> تحت درمان با کورتون خور کی یا تزریقی (پردنیزولون، هیدروکورتیزون، بتامتازون، دگز متازون....)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> شیمی درمانی یا پرتودرمانی در ۶ ماه خیر</td> <td><input type="checkbox"/> بیماریهای روماتیسمی یا خود یمنی تحت درمان</td> <td><input type="checkbox"/> کولیت روده</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> تحت درمان پرفشاری خون</td> <td><input type="checkbox"/> بیماری قلبی عروقی (سکته قلبی، آریتمی، تنگی عروق کرونر و بیماری یسکمیک قلب)</td> <td><input type="checkbox"/> دیابت</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> تارسایی کبد یا کلیه</td> <td><input type="checkbox"/> بیماری تنفسی مانند آسم /برونشیت مزمن/ آمفیزیم/ سایر بیماری ها: <input type="checkbox"/> هیچکدام</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> بدخیمی (نوع سرطان)	<input type="checkbox"/> پیوند عضاء	<input type="checkbox"/> تحت درمان با کورتون خور کی یا تزریقی (پردنیزولون، هیدروکورتیزون، بتامتازون، دگز متازون....)	<input type="checkbox"/> شیمی درمانی یا پرتودرمانی در ۶ ماه خیر	<input type="checkbox"/> بیماریهای روماتیسمی یا خود یمنی تحت درمان	<input type="checkbox"/> کولیت روده	<input type="checkbox"/> تحت درمان پرفشاری خون	<input type="checkbox"/> بیماری قلبی عروقی (سکته قلبی، آریتمی، تنگی عروق کرونر و بیماری یسکمیک قلب)	<input type="checkbox"/> دیابت	<input type="checkbox"/> تارسایی کبد یا کلیه	<input type="checkbox"/> بیماری تنفسی مانند آسم /برونشیت مزمن/ آمفیزیم/ سایر بیماری ها: <input type="checkbox"/> هیچکدام	
<input type="checkbox"/> بدخیمی (نوع سرطان)	<input type="checkbox"/> پیوند عضاء	<input type="checkbox"/> تحت درمان با کورتون خور کی یا تزریقی (پردنیزولون، هیدروکورتیزون، بتامتازون، دگز متازون....)												
<input type="checkbox"/> شیمی درمانی یا پرتودرمانی در ۶ ماه خیر	<input type="checkbox"/> بیماریهای روماتیسمی یا خود یمنی تحت درمان	<input type="checkbox"/> کولیت روده												
<input type="checkbox"/> تحت درمان پرفشاری خون	<input type="checkbox"/> بیماری قلبی عروقی (سکته قلبی، آریتمی، تنگی عروق کرونر و بیماری یسکمیک قلب)	<input type="checkbox"/> دیابت												
<input type="checkbox"/> تارسایی کبد یا کلیه	<input type="checkbox"/> بیماری تنفسی مانند آسم /برونشیت مزمن/ آمفیزیم/ سایر بیماری ها: <input type="checkbox"/> هیچکدام													
<p>اینجانب به کد ملی با آگاهی از اینکه پاسخ نادرست به هر یک از پرسش‌های فوق باعث خطر جدی سلامتی برای خود و سایر افراد جامعه خواهد بود، گواهی می‌کنم پاسخ کلیه پرسشها را با هوشیاری و دقیق و صداقت ثبت نموده ام و عاقب پاسخ نادرست به عهده اینجانب خواهد بود.</p>														
امضا	تاریخ	نام و نام خانوادگی												

الگوریتم بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا (قطعی، محتمل، مشکوک) به COVID-۱۹ (نسخه مخصوص پزشک)



* منظور از بھبود بالینی، قطع شدن تب به مدت سه روز (بدون استفاده از تب بر)، و رفع شکایات تنفسی است (به عنوان مثال بیمار دیسترس تنفسی، تنفس تندر، سرفه مکرر، تنفس سطحی نداشته باشد)

** در صورت عدم دسترسی به متخصص طب کار، به پزشک عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی ارجاع گردد.

این راهنمایی با هدف ارزیابی سلامت شاغلین با احتمال ابتلا به COVID-۱۹ پس از طی مراحل تشخیص و درمان، از نظر بازگشت به کار تهیه شده است. شایان ذکر است راهنمایی‌های عمومی و اختصاصی در خصوص COVID-۱۹ در محیط کار و وسائل حفاظت فردی در سایت مرکز سلامت محیط و کار به آدرس [در دسترس می‌باشد.](http://markazsalamat.behdasht.gov.ir)

منابع:

- فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID-۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری (ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید، نسخه پنجم، ششم فرودین ماه ۱۳۹۹)
- راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت COVID-۲۰۱۹ برای کارکنان مرکز بهداشتی درمانی
- دستورالعمل نحوه انجام معاینات سلامت شغلی مصوب ۱۳۹۷